Raport N° 26

J'ai Examinée L'observation Envoyé à Lacademie par Mr Moubalon cher. major de la Marine, et de L'hopital, à bajonne, qui raporte avoir vüe un chanoine au mois de Xbre dernier agé de 70 ans qui a eté jncomodé, de douleurs, et pesanteur destomac, apres des repas, et que lórs qu'elles digestions etoit faittes, il etoit soulagé, mais lorque de nouveaux, jl reprenoit des aliments il ressentoit Les mesmes jncomodités: on crut Le soulagé en Le purgant, en lui faisant prendre Les eaux de Coterat., Des Stomachiques, des toniques. mais tous ces differents remede, n'aporterent aucun Soulagement à son etat. jl passa un mois, et demie, dans cette Sictuation, et fautte de pouvoir digerer, et de soufrir, jl s'affoiblit, et fut contraint de garder sa chambre. Dans ce meme temps, jl Sentit tout à coup une legere douleur à L'aine Droitte, Mr moubalon, i trouva une tumeur vers L'anneau, qui etoit un peu jnegalle, et de la grosseur d'un petit oeuf. jl soubsonna que ce pouvoit etre de L'epiploon, jl fit des tentatives pour Le reduire, mais n'en pouvant venir à bout, jl Emploja des cataplames Emoliant pour ramolir la tumeur. mais vüe L'absence des signes de L'etranglement, jl pença que se pouvoit etre une tumeur humoralle. au bout de 12 jours

ARC 14 d. 31 n° 2

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Il sentit de la fluctuation, et 2 jours apres, la Matière se
fit un issue, alors Mr Monbalon dilata la playe, il
en sortit une quantité de Matière fetide, et des escarts,
au bout de 8 jours la suppuration devint louable;
mais il survint un epanchement de serosités immense,
noiratre, et aine brûnd: ce qui fit croire a Mr Monbalon
que les escarts, etoit des portions depiploon dans lesquelles
une portion dintestin avoit eté pincé, parceque la
suppuration devint plus epaisse, billieuse, enfin des
excrements plus liés, sont sortés par la playe et continuent
sans que la communication de lanus ait eté interceptée.
Dapres cet exposé, je crois que les premiers accidens de
douleur destomac, et des mauvaises digestions, eurent pour
cause une hernie epiploique, et que la douleur
survenue au bout de 6 semaine, et lepoque du pincement
dune portion du diametre de lintestin, le canal ayant
toujours eté libre, que quand à lexfoliation, que lors
que la cohesion en sera faitte aux parties voisines, que
les matières cesseront davoir cours par la playe,
comme cela est assés ord.re dans ces Cas.

cette observation m'a parü interessante, et merite
d'etre conservée, attendu que les accidens, que cet
ombalom raporte, sonts rarements pris, pour des
signe de hernie, surtout lorqu'il ne sonts pas
accompagné des accidens de l'etranglement. j'espere
presenter à l'academie, un memoire sur cette matiere
qui servira à prouver, les differentes circonstances, et
accidens, qui resulte de la sortie de l'epiploone, hors
de la capacité du bas ventre. a paris le 7 may 1772

Pipelet

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE